イネの種子消毒

1. 薬剤処理の手順

塩水選⇒水洗い⇒水切り⇒薬剤処理⇒風乾⇒浸種⇒催芽⇒播種

※ 浸種する場合、水温は10℃以下にしない

2. 主な種子消毒剤の対象病害虫と処理方法

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（日数）	使用回数	処理方法		病害虫名							
						種子粉衣	種子浸漬	ばか苗病	ごま葉枯病	いもち病	苗立枯病	もみ枯細菌病	苗立枯細菌病	褐条病	イネシンガレセンチュウ
エコホープＤＪ水	**生物農薬**	**ー**		***e**	**－**		**☆**	**◎**		**◎**	**リ**	**◎**	**◎**	**◎**	
タフブロック水	**生物農薬**	**ー**		***d**	**－**		**☆**	**◎**		**◎**	**フ**	**◎**	**◎**	**◎**	
				***b**		**☆**		**◎**		**◎**	**フ**	**◎**	**◎**		
スポルタック乳	ＥＢＩ	3		*b	1		☆	◎	◎	◎					
トリフミン乳	ＥＢＩ	3		*b	1		☆	◎	◎	◎					
ヘルシード乳	ＥＢＩ	3		*b	1		☆	◎	◎	◎					
スターナ水	他	31		*b	1	☆	☆					◎	◎	◎	
				*c			☆					◎	◎	◎	
ヘルシードＴFL	有機硫黄・ＥＢＩ	M3・3		*b	1		☆	◎	◎	◎	ト	◎		◎	
ベンレートＴ水20	有機硫黄・ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	M3・1		*b	1		☆	◎	◎	◎	ピ			◎	◎
						☆		◎	◎	◎	ピ	◎		◎	◎
ホーマイコート水	有機硫黄・ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	M3・1		*b	1	☆		◎	◎	◎	◎				
ホーマイ水	有機硫黄・ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	M3・1		*b	1		☆	◎	◎	◎	◎				
						☆		◎	◎	◎	◎				◎
スポルタックスターナＳＥ	他・ＥＢＩ	31・3		*b	1		☆	◎	◎	◎		◎	◎	◎	
エビセクト水	ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝ	14	劇	*b	1		☆								◎
パダンＳＧ溶	ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝ	14	劇	*b	1		☆								◎
スミチオン乳	有機リン	1B		*a	1		☆								◎

*a:播種前
*b:浸種前
*c:浸種後
*d:浸種前、浸種前～催芽前、催芽前、催芽時(病害及び使用方法によって使用時期が異なるので注意)
*e:浸種前～催芽前、浸種前～催芽時、催芽時(病害及び使用方法によって使用時期が異なるので注意)

ト:対象の病原菌はトリコデルマ菌及びリゾープス菌
ピ:対象の病原菌はピシウム菌、リゾープス菌、トリコデルマ菌及びフザリウム菌
フ:対象の病原菌はリゾープス菌、トリコデルマ菌及びフザリウム菌
リ:対象の病原菌はリゾープス菌