セルリー(野菜類、セリ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	斑点病	軟腐病	灰色かび病	うどんこ病	菌核病	アブラムシ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	タバコガ	ハダニ類	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ
アグロケア水	**生物農薬**	－		1	－	◎		◎	◎											
エコショット顆水	**生物農薬**	44		1	－	◎														
スコア顆水	ＥＢＩ	3		1	3	◎														
トリフミン水	ＥＢＩ	3		1	2	◎														
アフェットFL	アミド	7		1	3	◎				◎										
アミスター20FL	ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ	11		3	4	◎														
ストロビーFL	ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ	11		1	3	◎														
トップジンM水	ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	1		60	2	◎														
ヨネポン水	有機銅	M1		7	3	◎	◎													
スターナ水	他	31		14	3		◎													
ダコニール1000FL	他	M5		21	2	◎														
スピノエース顆水	**ｽﾋﾟﾉｼﾝ**	**5**		**3**	**3**								◎							
コロマイト乳	**ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ**	**6**		**3**	**2**													◎		
カスケード乳	ＩＧＲ	15		14	3							◎	マ		◎					
トリガード液	ＩＧＲ	17		7	3								マ							
ネマモール粒30	殺線虫	8A	劇	*a	1														◎	◎
アクタラ粒５	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A		*b	2								ナ							
				*c									ナ							
アドマイヤーFL	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A	劇	7	3						◎									
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A		14	2						◎									
アルバリン粒 スタークル粒	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A		*b	1						◎									
ダントツ粒	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A		*b	1						◎									
モスピラン顆溶	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A	劇	7	2						◎		ナ							
モスピラン粒	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	4A		*b	1						◎		ナ							
アニキ乳	ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ	6		1	3										◎					
アファーム乳	ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ	6		7	3								◎	◎	◎	◎	◎			
コテツFL	他	13	劇	14	2									◎						
ハチハチFL	他	21A	劇	30	2						◎		ナ							
プレオFL	他	UN		1	2										◎					

*a:定植前まで　*b:定植時　*c:鉢上時
ナ:ナモグリバエ　マ:マメハモグリバエ