

ハイドランジア、フェニックス、ブバルディア (樹木類の登録農薬も使用できる)

ハイドランジア

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
輪斑病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ゲッター水和剤● 1000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。
灰色かび病	感染期～発生初期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ゲッター水和剤● 1000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。
葉腐病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 リゾレックス水和剤 500～1000倍	

フェニックス・ロベレニー

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
炭疽病		・次の薬剤を散布する。 トップジンM水和剤●* 1000～2000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。 *樹木類での登録
トビモンオオエダシャク	発生初期	・次の薬剤を散布する。 バシレックス水和剤 500～1000倍	
その他の病害虫		褐紋病、カイガラムシ類	

ブバルディア

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
立枯性病害		・圃場の排水に留意し、密植を避ける。	ピシウム菌、リゾクトニア菌のいずれによっても発生する。
灰色かび病		・施設内の過湿に留意し、発病茎・花はただちに除去する。	
アザミウマ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 オルトラン水和剤* 1000倍	*樹木類での登録
アブラムシ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 スミチオン乳剤* 1000倍	*樹木類での登録
カイガラムシ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 カルホス乳剤* 1000倍	*樹木類での登録
ハダニ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 バロックフロアブル* 2000倍	*樹木類での登録
その他の病害虫		コナジラミ類、ハモグリバエ類、チャノホコリダニ イチゴセンチュウ、ネコブセンチュウ	