

## 未成熟ソラマメ

(野菜類、豆類(未成熟)の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒性	使用 時期 (回数)	使用 回数	疫 病	さ び	苗 立 枯 病 (リゾク トニア菌)	赤 色 斑 点 病	灰 色 か び 病	菌 核 病	茎 腐 病	輪 紋 病	ア ブ ラ ム シ 類	カ ザ ミ ウ マ バ エ 類	ダ イ ズ サ ヤ タ マ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	マ メ シ ン ク イ ガ 類	マ メ ヒ メ サ ヤ ム シ ガ 類	ア ズ キ ノ メ イ ガ 類	シ ロ イ チ モ ジ マ ダ ラ メ イ ガ 類	ヨ ト ウ ム シ ジ ミ 類	ウ ラ ナ ミ シ ジ ミ 類
Zボルドー水	M1		-	-				◎														
クブラビットホル テ水	M1		-	-				◎														
タチガレン液	32		*a	3			◎															
カナメFL	7	劇	1	4	◎			◎	◎													
カンタスDF	7		1	3	◎			◎														
アミスター20FL	11		3	3	◎																	
ファンタジスタ顆 水	11		1	3	◎			◎	◎	◎												
ロブラール水	2		1	3				◎														
リゾレックス水	14		1	2							株											
			*b	1		土																
オンリーワンFL	3		1	2	◎																	
ジマンダイセン水	M3		30	3	◎							◎										
リドミルゴールド MZ	4・M3		30	3	◎																	
スミチオン乳	1B		3	3								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
アディオン乳	3A		7	3								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アドマイヤー1粒	4A		*b *c	1								◎	◎									
アドマイヤーFL	4A	劇	*d	3								◎	◎									
アドマイヤー顆水	4A	劇	*d	3								◎	◎									
カスケード乳	15		1	3												マ					ハ	
プレバゾンFL5	28		1	3												◎						

\*a:播種後及び生育期(但し収穫30日前まで) \*b:播種時 \*c:定植時

\*d:収穫7日前まで(但し露地栽培については開花期終了後から)

マ:マメハモグリバエ ハ:ハスモンヨトウ

株:株元灌水 土:土壌灌水

未成熟ソラマメ