

**アシタバ** (野菜類、セリ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名          | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(日数) | 使用回数 | 葉枯病 | 黒枯病 | アブラムシ類 | キアゲハ | ウドノメイガ | ハダニ類 |
|--------------|-----------|------|----------|------|-----|-----|--------|------|--------|------|
| ロブラール水       | 2         |      | 7        | 3    | ◎   |     |        |      |        |      |
| ダコニール 1000FL | M5        |      | 30       | 3    |     | ◎   |        |      |        |      |
| マラソン乳        | 1B        |      | 7        | 3    |     |     |        |      | ◎      |      |
| トレボン乳        | 3A        |      | 14       | 3    |     |     | ◎      |      |        |      |
| モスピラン顆溶      | 4A        | 劇    | 1        | 3    |     |     | ◎      | ◎    |        |      |
| コロマイト乳       | 6         |      | 1        | 1    |     |     |        |      |        | ◎    |
| コテツ FL       | 13        | 劇    | 7        | 2    |     |     |        |      | ◎      |      |

| 病害虫名    | 防除時期 | 防除方法                                                                                                                                                  | 参考事項                                                                                           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 葉枯病     | 生育期  | ・発生を見たら次の薬剤を散布する。<br>ロブラール水和剤 1000倍                                                                                                                   |                                                                                                |
| ウドノメイガ  | 生育期  | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。<br>コテツフロアブル 2000倍<br>マラソン乳剤 1000倍                                                                                              |                                                                                                |
| ナメクジ類   | 生育期  | 1. 圃場内の落ち葉や枯れ草を除去する。<br>2. 圃場周辺の雑草地の土壌表面に次の薬剤を散布する。<br>マイキラ (FL) *1<br>3. 発生前～発生初期に次の薬剤を散布する。<br>クプロシールド (FL) *2<br>4. 発生を見たら次の薬剤を散布する。<br>スラゴ (粒) *3 | *1ナメクジ類、カタツムリ類、が加害する農作物等での登録。<br>*2野菜類での登録。<br>*3ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメシジミマイマイが加害する農作物等での登録。 |
| その他の病害虫 |      | ヤマトフキバツタ、クロモンキノメイガ、ハナウドモグリガ、ネギアザミウマ                                                                                                                   |                                                                                                |

アシタバ