

豆類(種実)*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	う ど ん こ 病	灰 色 か び 病	褐 斑 病	炭 疽 病	菌 核 病	苗 立 枯 病	さ び 病
硫黄粉剤50	M2		-	-	◎						
ベンレート水	1		14	4					イ		
アフェットFL	7		1	3		エ			エ		エ
カナメFL	7	劇	1	4		カ			カ		
カンタスDF	7		7	3					リ		
ケンジャFL	7		14	2		オ			オ		
スクレアFL	11		1	3		エ		エ	エ		
ファンタジスタ顆水	11		7	3		ア			ア		
キヒゲンR-2FL	M3		*a	1						ウ	
バルコート水	M7		7	3	ダ		ダ	ダ			
ニマイバー水	1・10		14	4		エ		エ	エ		

*1:豆類(種実) …「農薬登録における適用作物名について」(P.41)を参照のこと。

*a:播種前

ア:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、エンドウマメ、ラッカセイ、ソラマメを除く

イ:ダイズ、インゲンマメ、エンドウマメ、ラッカセイを除く

ウ:ダイズ、アズキ、インゲンマメを除く

エ:ダイズ、ラッカセイを除く

オ:インゲンマメ、ラッカセイを除く

カ:アズキ、ソラマメ、ラッカセイを除く

ダ:ダイズを除く

リ:ラッカセイ、アズキ、インゲンマメを除く

豆
類
(
種
実
)

豆類(種実)*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人	使	使	使	ア	コ	カ	ア	ダ	タ	シ	ア	マ	マ	ウ	ハ	シ	コ	フ	ハ	そ
		畜	用	用	用	ブ	ナ	メ	ザ	イ	ロ	シ	ア	マ	マ	ウ	ハ	シ	コ	フ	ハ	そ
		毒	時	用	用	ラ	メ	ミ	サ	ズ	ネ	ロ	ズ	メ	ヒ	ラ	ス	ロ	コ	フ	ハ	そ
		性	期	条	条	シ	シ	シ	ヤ	メ	エ	イ	イ	シ	シ	シ	シ	シ	シ	シ	シ	シ
			(回	件	類	類	類	類	類	エ	エ	ガ	ガ	ガ	ガ	ミ	ウ	ウ	ウ	ウ	ウ	ウ
			数)	数	類	類	類	類	類	エ	エ	ガ	ガ	ガ	ミ	ウ	ウ	ウ	ウ	ウ	ウ	ウ
エコマスターBT	11A	*g	-															◎				
サブリーナFL	11A	*g	-														◎					オ
ゼンターリ顆水	11A	*g	-														◎					
フローバックDF	11A	*g	-														◎					
スパイデックス	-	*d	-	施																		◎
スワルスキー	-	*e	-	施	◎		◎															チ
スワルスキープラス	-	*e	-	施	◎		◎															チ
コンフェューザーV	-	*f	-														◎					コ
フェロディンSL	-	*h	-														雄					
カルホス粉	1B	*b	1								ダ								ダ			
スミチオン乳*2	1B	21	4	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ	ソ												
ダイアジノン粒5	1B	60	3																	イ		
		*b	1								イ											
トレボン乳	3A	14	2	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	ズ	
トレボン粉DL	3A	14	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
プレバゾンFL5	28	7	2													ウ						
ダントツ溶	4A	7	3	イ																		
モスピラン顆水	4A	劇	14	3	マ	マ	マ															
ディアナSC	5	1	2				ウ									ウ						キ
コルト顆水	9B	7	3	カ																		
プレオFL	UN	7	2													ラ	ラ					ら
石灰窒素55	-	*c	1																			せ
粉衣用ベアーカーミンD粉	1B・ ・-	劇	*a	1							イ											

*1:豆類(種実)…「農薬登録における適用作物名について」(P.41)を参照のこと。
 *2:商品によって作目・害虫の登録が異なる場合があるので必ず商品のラベル等を確認してから使用する。

豆類(種実)

豆類(種実)*¹(作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(未成熟)の登録農薬は使用不可)

*a:播種前

*b:播種時

*c:播種前又は植付前

*d:発生初期

*e:発生直前～発生初期

*f:対象作物の栽培全期間

*g:発生初期(但し収穫前日まで)

*h:成虫発生初期～発生終期まで

ア:ダイズ、アズキ、インゲンマメを除く

イ:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、ラッカセイを除く

ウ:ダイズ、アズキ、ラッカセイを除く

エ:インゲンマメ、エンドウマメを除く

オ:オオタバコガ、ヨトウムシに適用

カ:ラッカセイを除く

コ:タマナギンウワバ、イラクサギンウワバ、コナガ、オオタバコガ、ヨトウガ、シロイチモジヨトウに適用

キ:ハモグリバエ類(但しダイズ、アズキ、ラッカセイを除く)

ズ:ダイズ、アズキを除く

セ:センチュウ類

ソ:ダイズ、アズキ、インゲンマメ、ソラマメを除く

ダ:ダイズを除く

チ:チャノホコリダニ

マ:ダイズ、インゲンマメを除く

ラ:ダイズ、ラッカセイを除く

ら:ハモグリバエ類、オオタバコガに適用(但しダイズ、ラッカセイを除く)

雄:豆類でハスモンヨトウ雄成虫に登録

施:施設栽培