

豆類(未成熟)*¹ (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	灰色かび病	菌核病	炭疽病	さび病	苗立枯病	立枯病
ベンレート水	1		30	3		ヤ				
			*b	2						ヤ
アフエットFL	7		1	3	ダ	ダ		ダ		
カナメFL	7	劇	1	4	ミ	ミ				
パレード20FL	7		1	3	エ	エ				
スクレアFL	11		1	3	エ	エ	エ			
ファンタジスタ顆水	11		1	3	マ	マ				
セイビアーFL20	12		1	3	ヤ					
リゾレックス水	14		*c	1					®サ	
ニマイバー水	1・10		30	3	ヤ	ヤ	ヤ			

*1:豆類(未成熟)…「農薬登録における適用作物名について」(P.41)を参照のこと。

*a:播種前 *b:発芽14日後まで *c:播種時

®:リゾクトニア菌による病害

エ:さやえんどうを除く

サ:さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめを除く

ダ:えだまめを除く

マ:えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く

ミ:さやえんどう、未成熟そらまめを除く

ヤ:えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く

豆類(未成熟)*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ	コナジラミ	カメシ	アザミウマ	ハマグリ	ダイズ	タネ	オオタバコ	オオタバコ	シロイチモ	ハスモン	マメシ	マメヒメ	シロイチモ	ウラナミ	ネキリ	インゲン	コガネ	チャノホ	ハダニ	
コロマイト乳	6		1	2																				◎	
エコマスターBT	11A	*d	-											◎	◎										
フローバックDT	11A	*d	-											◎	◎										
スミチオン乳	1B		21	4	エ	◎	◎		◎							◎	◎	◎							
マラソン乳	1B		7	3	◎	◎	◎	◎								◎					◎	◎		◎	
アディオン乳	3A		14	3	ゾ	◎		◎	◎				◎	◎	◎				◎	◎					
ガードバイトA粒	3A	*c		3																	◎				
アドマイヤー顆水	4A	劇	*e	2	ミ	◎																			
アドマイヤー1粒	4A		*b	1	エ	◎																			
スタークル顆溶	4A		7	2	ア	◎			◎																
ダントツ溶	4A		3	3	ダ	◎																			
モスピラン顆溶	4A	劇	7	3	ヤ	◎	◎		◎																
ディアナSC	5		1	2	イ			◎	◎						◎										
アニキ乳	6		1	3	え										◎										
アフーム乳	6		3	2	イ				◎																
コテツFL	13	劇	1	2	み																			◎	
ダニトロンFL	21A		7	1	イ																		◎	◎	
フェニックス顆水	28		1	2	ヤ										◎										
グレーシア乳	30		1	2	ダ				◎						◎										
プレオFL	UN		1	2	イ				◎			◎		◎	◎										

*1: 豆類(未成熟) … 「農薬登録における適用作物名について」(P.41)を参照のこと。

*a: 播種前 *b: 播種時又は定植時 *c: 生育初期 *d: 発生初期(但し収穫前日まで)

*e: 収穫前日まで(但し露地栽培については開花期終了後から使用)

ア: エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウ、実エンドウ、未成熟ササゲ、未成熟ソラマメを除く

イ: サヤインゲンを除く

エ: エダマメ、サヤインゲン、未成熟ソラマメを除く

ソ: エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウ、未成熟ソラマメを除く

ダ: エダマメを除く

ミ: 未成熟ソラマメを除く

ヤ: エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウを除く

え: エダマメ、サヤエンドウを除く

み: サヤインゲン、サヤエンドウ、実エンドウを除く

豆類(未成熟)