

マルメロ、カリン(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

マルメロ

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	赤星病	ごま色斑点病	黒点病	腐らん病	ゆ合併促進	アブラムシ類	シンクイムシ類
I Cボルドー412FL	M1		-	-		◎					
トップジンM水	1		1	6				◎			
トップジンMペースト	1		*c	3					◎		
スコア顆水	3		7	3		◎					
トリフミン水	3		14	3	◎						
オキシンドー水80	M1		14	4			◎				
キノンドー水80	M1		14	4		◎	◎				
オーソサイド水80	M4		14	6			◎				
ダコニール1000FL	M5		30	4		◎					
ベフラン液25	M7	劇	*a	*b				◎			
サイアノックス水	1B		45	2						◎	◎
アディオンFL	3A		14	2							◎

*a:展葉期 *b: 4回以内(但し開花期以降散布は3回以内)

*c: 剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後

カリン

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	赤星病	ごま色斑点病	黒点病	腐らん病	白かび斑点病	ゆ合併促進	シンクイムシ類	ナシヒメシンクイ
トップジンM水	1		1	6				◎				
トップジンMペースト	1		*c	3						◎		
トリフミン水	3		1	3	◎							
オキシンドー水80	M1		14	4			◎					
キノンドー水80	M1		14	4		◎	◎					
ダコニール1000FL	M5		45	3		◎	◎		◎			
ベフラン液25	M7	劇	*a	*b				◎				
アディオン水	3A		3	3							◎	◎
モスピラン顆溶	4A	劇	14	2								◎

*a:展葉期 *b: 4回以内(但し開花期以降散布は3回以内)

*c: 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後