

ナバナ類^{*1} (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	べと病	黒斑病	白斑病	菌核病	白さび病	根こぶ病	黒腐病	軟腐病
カンタスDF	7		7	1					◎				
ストロビーFL	11		1	2						な			
アリエッティ水	P7		1	2						な			
ネビジン粉	36		*a	1							ネ		
				1							な		
ランマンFL	21			3	3					◎			
			*b	1	☆					◎			
フロンサイド粉	29		*a	1						な			
ヨネポン水	M1		14	3						◎			◎
ダコニール1000FL	M5		*c	3		な	な	な		な			
				60	3		ナ	ナ	ナ		ナ		
カッパーシン水	24・M1		14	3								◎	

*1: ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 41)を参照のこと。

*a: 播種又は定植前

*b: 定植前日～当日

*c: 出蕾前(但し収穫21日前まで)

な: なばなのみに適用

ナ: なばなを除く

ネ: なばな、みずかけなを除く

☆: セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。なお、この使用方法は、土耕栽培による苗には使用できない。

ナバナ類^{*1} (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ	コ ナ ガ	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ケ ラ ニ	ハ ク サ イ ダ ニ
ダイアジノン粒5	1B		*b	1										ハ		ハ	ハ	
			*b	1										ハ		ハ	ハ	
			*c												ハ			
アディオソ乳	3A		1	3				◎		◎								
ガードベイトA粒	3A		*d	3									◎					
スカウトFL	3A	劇	7	2								ヨ						
アドマイヤー顆水	4A		7	2		◎												
モスピラン顆溶	4A	劇	14	1		◎		◎								◎		
ディアナSC	5		1	2					◎				◎					◎
アフーム乳	6		7	2					◎	◎	◎	ヨ	◎					
コテツFL	13	劇	3	2									◎					
カスケード乳	15		21	3			◎						◎	◎				
プリロソソ粒オメガ	28		*c	1		◎												
プレバソンFL5	28		*a	1	☆						◎							
			1	3				◎		◎		◎						
ウララD F	29		1	2		◎												
プレオFL	UN		14	2					◎				◎					
ジュリボFL	4A・ 28		*a	1	☆	◎			◎		◎		◎					

*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 41)を参照のこと。

*a:育苗期後半～定植当日 *b:播種時 *e:定植時 *h:生育初期
は:はなっこりーとなばなに適用
ハ:はなっこりーとなばなを除く
ヨ:ヨトウムシ

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。なお、この使用法は、土耕栽培による苗には使用できない。