

モロヘイヤ(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	灰色かび病	黒星病	アブラムシ類	コナジラミ類	カメムシ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	マメコガネ	ハダニ類
アミスター20FL	11		1	4	◎	◎							
スピノエース顆水	5		3	3						◎			
コロマイト乳	6		1	1									◎
スミチオン乳	1B		14	2			◎		◎	◎		◎	
トレボン乳	3A		14	1					◎				
アクタラ顆容	4A		7	3						ギ			
アドマイヤーFL	4A	劇	14	1						◎			
ベストガード溶	4A		7	3				◎					
モスピラン顆容	4A	劇	21	1				◎					
アフファーム乳	6		1	3							◎		
コテツFL	13	劇	7	1						◎			
カスケード乳	15		7	2							◎		
ダニトロンFL	21A		7	1									◎
プレバソンFL5	28		1	2							◎		

ギ:ネギアザミウマ

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
アザミウマ類	生育期	<ul style="list-style-type: none"> 発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アクタラ顆粒水溶剤# 2000倍 アドマイヤーフロアブル 2000倍 コテツフロアブル 2000倍 スピノエース顆粒水和剤 5000倍 トレボン乳剤 1000倍 	#ネギアザミウマのみの登録
マメコガネ	生育期	<ul style="list-style-type: none"> 発生を見たら次の薬剤を散布する。 スミチオン乳剤 1000倍 	
ハダニ類	生育期	<ul style="list-style-type: none"> 発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 コロマイト乳剤 1500倍 ダニトロンフロアブル 2000倍 	
その他の病害虫		苗立枯病、変形菌病	