

シシトウ^{*1}(野菜類、トウガラシ類の登録農薬も使用できる)

シシトウ

| 薬剤名 | 作用機構分類コード | 畜 | 人使 用時 期 | 使 用 回 数 | 疫 病 数 | 黒 枯 病 病 | 灰 か 病 病 | 斑 点 病 病 | 白 び 病 病 | ア ザ ミ ウ マ | ア ブ ラ ウ マ | コ ナ ジ ラ シ | コ ナ イ ガ ラ ム | マ ハ モ グ リ バ | オ カ イ ガ ラ ム | ス モ バ リ コ | ハ タ ム グ リ バ | ハ ン ヨ ト | ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ |
|--------------|-----------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| インプレッションクリア水 | BM2 | | *d | - | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| トップジンM水 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| アフェットFL | 7 | | 1 | 3 | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| モンカットFL40 | 7 | | 1 | 3 | | | | | | | | | ◎ | | | | | | |
| ストロビーFL | 11 | | 1 | 2 | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| スマレックス水 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| ロブラー水 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| リゾレックス水 | 14 | | 1 | 2 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | |
| ルビゲン水 | 3 | | 1 | 3 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| ユニフォーム粒 | 4・11 | | 1 | 3 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| スピノエース顆水 | 5 | | 1 | 2 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | |
| コロマイト乳 | 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | ◎ | | | | | |
| ラグビーMC粒 | 1B | | *c | 1 | | | | | | | | | | | | | ◎ | | |
| ロディー乳 | 3A | 劇 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| アクタラ顆溶 | 4A | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| ベストガード粒 | 4A | | *a | 1 | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | *b | | | | | | | | | | | ナ | ◎ | | | | |
| モスピラン顆溶 | 4A | 劇 | 1 | 2 | | | | | | | | | | ◎ | | | | | |
| ニッソラン水 | 10A | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| コテツFL | 13 | 劇 | 1 | 2 | | | | | | | | ア | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アタプロン乳 | 15 | | 1 | 3 | | | | | | | | ナ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カスケード乳 | 15 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | ◎ | | | |
| ファルコンFL | 18 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マトリックFL | 18 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | ◎ | | | |
| サンマイトFL | 21A | 劇 | *c | 2 | | | | | | | | | | ◎ | | | | | |
| スターマイトFL | 25A | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | |
| ベネビアOD | 28 | | 1 | 3 | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | | |
| ウララDF | 29 | | 1 | 3 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | |
| ファインセーブFL | 34 | 劇 | 1 | 3 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | |

*1:シシトウとピーマンは使用できる農薬が異なる。

*a:育苗期 *b:定植時 *c:定植前 *d:発病前～発病初期まで

ア:ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ及びミナミキイロアザミウマ

ナ:ミナミキイロアザミウマ

シシトウ^{*1}(野菜類、トウガラシ類の登録農薬も使用できる)

| 病害虫名 | 防除時期 | 防除方法 | 参考事項 |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 疫病 | 定植前 | ・圃場の排水をはかる。 | * トウガラシ類での登録 △定植後～定植後3週間までの使用は避ける。 |
| | 生育期 | ・発病初期に次のいずれかの薬剤を施用する。 ランマンプロアブル* 2000倍 ユニフォーム粒剤△ 3 g /株 | |
| 白絹病 | 生育期 | 1. 圃場の排水をはかる。 2. 発病初期に次の薬剤を 1 ℥ / m ² 株元灌注する。 リゾレックス水和剤 1000倍 | |
| モザイク病 (CMV) | | ・トマトモザイク病に準ずる。 | シルバーマルチ(ムシコン等)によるマルチ栽培が有効。 |
| 黄化えそ病 (TSWV) | 育苗期 ～生育期 | ・トマト黄化えそ病に準ずる。 | |
| アブラムシ類 | 育苗期 | ・育苗期に次の薬剤のいずれかを株元散布する。 アルバリン粒剤* 1 g /株 スタークル粒剤* 1 g /株 | * トウガラシ類での登録 |
| | 定植時 | ・定植時に次の薬剤を施用する。 アクタラ粒剤 5*(植穴) 1 g /株 | |
| | 生育期 | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アルバリン顆粒水溶剤* 3000倍 スタークル顆粒水溶剤* 3000倍 | |
| アザミウマ類 | 生育期 | ・発生を見たら次の薬剤を散布する。 スピノエース顆粒水和剤 20000倍 | |
| オオタバコガ | 生育期 | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アタブロン乳剤 2000倍 アファーム乳剤*1 2000倍 カスケード乳剤 2000倍 ファルコンプロアブル 2000倍 プレオフロアブル*2 1000倍 | *1 トウガラシ類での登録 *2 トウガラシ類のタバコガ類での登録 |
| ハスマンヨトウ | 生育期 | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アタブロン乳剤 2000倍 ファルコンプロアブル 4000倍 | |
| ハダニ類 | 生育期 | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 ニッソラン水和剤 3000倍 ロディー乳剤 2000倍 | |
| その他の病害虫 | 炭疽病 | | |

*1: シシトウとピーマンは使用できる農薬が異なる。