

ポインセチア（樹木類の登録農薬も使用できる）

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（日数）	使用回数	うどんこ病	アブラムシ類	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	※タバココナジラミ類	チビクロバネキノコバエ	シヤクトリムシ類	ケムシ類	オビカレハ
モレスタン水	M10/UN		*d	10	◎								
			*a			◎	○	○					
エンストリップ	-		*a	-		施	施	施					
トレボン乳	3A		-	6		◎	○	○					
			*b							◎	◎	◎	
アドマイヤーFL	4A	劇	*a	5		施	施	施	施				
アドマイヤー1粒	4A		*c	5		◎	◎	○	○				
ベストガード溶	4A		*a	4		◎	◎	○	○	◎			
ノーモルト乳	15		*a	2			◎	○	○				
アプロード水	16		*a	6				幼	幼				
サンマイトFL	21A	劇	-	2			◎	○	○				
アプロードエースFL	16・21A		*a	6			◎	○	○				

\*a: 発生初期  
\*b: 幼虫発生期  
\*c: 生育期  
\*d: 発病初期

施: 施設栽培  
幼: 幼虫

※: タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)

## ポインセチア（樹木類の登録農薬も使用できる）

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
根腐病・立枯病	生育期	・灌水過多にならないように注意する。	根腐病はピシウム菌により、9～12月にかけて発生する。 立枯病はリゾクトニア菌による。
灰色かび病	生育期	・施設内の過湿に留意し、発病株はただちに処分する。	
うどんこ病	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 モレスタン水和剤△ 2000倍	△品種によっては苞葉に葉害を生じるおそれがあるので苞葉着色後は使用しない。
タバココナジラミ（オンシツコナジラミも防除法は同じ）	生育期	・発生初期に次の薬剤のいずれかを散布する。 アブロードエースフロアブル# 1000倍 サンマイトフロアブル# 1000倍 ベストガード水溶剤# 1000倍	#コナジラミ類での登録