

## ニンニク (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分 類コ ード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	薬 枯 病	白 斑 病	黒 腐 核 病	春 腐 病	さ び 病	白 絹 病	黄 斑 病	ア ザ ミ ウ マ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ネ ギ コ ガ	チ ユ ー リ ッ プ サ ビ ダ ニ	イ モ グ サ レ セ ン チ ユ ウ
コサイド3000DF	M1		-	-				◎								
Zボルドー水	M1		-	-	◎			◎	◎							
アミスター20FL	11		7	3	◎				◎							
ストロビーFL	11		7	3					◎							
ファンタジスタ顆水	11		7	3	◎	◎			◎		◎					
メジャーFL	11		*c	3					◎	◎						
スマレックス水	2		*a	1			◎									
オンリーワンFL	3		7	3	◎	◎			◎		◎					
トリフミン水	3		1	3	◎											
モンガリット粒	3		*a	1			◎									
		*d	2						◎							
ラー乳	3		3	3					◎							
バリダシン液5	U18		3	5				◎								
ジマンダイセン水	M3		7	5	◎	◎										
ペンコゼブ水	M3		7	5	◎											
ダコニール1000FL	M5		7	6	◎	◎			◎		◎					
ベルコート水	M7		3	3	◎											
テーク水	3・M3		7	3	◎	◎			◎							
シグナムWDG	7・11		3	3	◎	◎					◎					
アグリマイシン-100水	25・41		7	3				◎								
カスミンボルドー水	24・M1		7	5				◎								
カセット水	31・24		7	2				◎								
ポリバリン水	19・M7		3	3	◎						◎					
ナレート水	31・M1		7	2				◎								
ベンレートT水20	1・M3		*a	1			◎									◎
ホームイ水	1・M3		*a	1			◎									◎
ハチハチ乳	39・21A	劇	7	2					◎		◎	◎	◎	◎	◎	
エコマスターBT	11A		*b	-										◎		
フローバックDF	11A		*b	-										◎		
オルトラン水	1B		7	2								◎	◎			
ガードホープ液	1B	劇	*a	1											浸	
ジェイエース溶	1B		60	1												灌
ダイアジノン水34	1B	劇	7	2								◎	◎			
ネマトリンエース粒	1B		14	3										◎		
ラグビーMC粒	1B		*a	1												◎
アディオ乳	3A		*a	1												
マブリック水20	3A	劇	1	2								◎	◎			
モスピラン顆溶	4A	劇	3	2								◎	◎	◎		
モベントFL	23		1	2											◎	
ベネビアOD	28		7	3								◎	◎	◎		
ファインセーブFL	34	劇	1	2								◎				
ビーラム粒	-		*a	1												◎

\*a:植付前 \*b:発生初期 (但し収穫前日まで) \*c:抽苔始めから収穫前日

\*d:土寄せ時 (但し、収穫75日前まで) (茎葉展開期) 浸:種球浸漬 灌:土壤灌注

ニ  
ン  
ニ  
ク