

病虫害発生予察情報

5 月月報

平成 12 年 6 月 20 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

5 月	気 温		降 水 量		日照時間	
	最 高	最 低	平 均	(mm)	(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)
上旬	23.3	1.4	13.7	1.6	18.0	1.1
中旬	22.0	0.1	14.7	1.9	17.8	0.5
下旬	26.5	3.3	16.9	3.1	21.3	2.8
平均	24.0	1.6	15.1	2.2	19.1	1.5
合計					51	45

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979～1990 年の平均値)からの差(比)

気 温：上・中旬は平年並、下旬は平年よりかなり高かった。

降 水 量：上旬は平年よりかなり少なく、中旬は平年並、下旬はやや少なかった。

日照時間：上旬は平年よりかなり多く、中旬はかなり少なく、下旬は平年並であった。

< 天候概況 >

上旬は全般的に移動性高気圧に覆われて晴れの日が多かった。9 日は最高気温が 25 を越える今年初の夏日となった。

中旬は低気圧に伴う前線や上空に流れ込んだ寒気の影響により、雨の日が多かった。特に 15 日は都心部で 1 時間あたり最大 15.5mm の強い雨となった。

下旬は移動性高気圧が周期的に通過し、晴れて気温が高くなる日が多かった。

2 作物生育概況

(1) ム ギ(コムギ)

生育は順調で、黄熟期は平年より 5 日早く、前年より 2 日遅かった。

(2) イ ネ

育苗箱、苗代ともに生育は平年よりやや早かった。

(3) サツマイモ

苗の活着は良好であった。

(4) 果 樹

ナ シ：着果の程度は平年より多かった。

カ キ：開花期は昨年より 1～3 日遅いものの、平年より 2～5 日早かった。

ク リ：開花期は平年より 1 日程度早かった。

ブドウ：開花期は昨年より 1 日遅いものの、平年より 5 日程度早かった。

(5) 茶 樹

収穫開始は平年に比べて 3 日遅れたが、茶芽の伸育は良好であり、摘採終了は平年並であった。収量は平年と比較して多かった。

(6) 野菜類

果菜類：定植後のトマト、キュウリ、ナス等の生育は概ね順調であった。

葉菜類・根菜類：5 月 3 日に雹が降り、北多摩北部、練馬区等のハウレンソウ、カブ、キャベツなどで被害がみられ、その後の生育や品質等で影響を受けた。その他の地域では概ね順調な生育を示した。

3 病害虫の発生概況

(1) イネの病害虫

ばか苗病	< 少 >	育苗箱での発生は各地とも少なかった。
イネミズゾウムシ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ツマグロヨコバイ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ヒメトビウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

(2) 果樹の病害虫

ナ シ

赤星病	< やや多 多 >	各地とも発生はやや多 多かった。
黒星病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
カメムシ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ハマキムシ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

カ キ

カキクダアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
-----------	-------	---------------

ウ メ

アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
チョッキリゾウムシ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

キウイフルーツ

キウイヒメヨコバイ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
-----------	-------	--------------

(3) 茶樹の病害虫

ハマキムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
カンザワハダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(4) 野菜の病害虫

キュウリ

うどんこ病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
べと病	< 並 やや多 >	各地とも発生は平年並 やや多かった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
スリップス類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ウリハムシ	< 一部多 >	町田市ほか一部で発生が多かった。

トマト（施設）

灰色かび病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
葉かび病	< 並 やや多 >	各地とも発生は平年並 やや多かった。
黄化えそ病	< やや多 >	区部の 2 施設で発生が認められ、このうち 1 施設では発生がやや多かった。
白ぶくれ症状	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
タバココナジラミ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
オンシツコナジラミ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 一部やや多 >	練馬区で発生がやや多かった。
オオタバコガ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ナス

アザミウマ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ハダニ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ニジュウヤホシテントウ		

< 局所やや多 > 局所的に発生はやや多い圃場があった。

イチゴ

灰色かび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
-------	-------	---------------

キャベツ

菌核病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
コナガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ヨトウガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
モンシロチョウ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

コマツナ

白さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
コナガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ナモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
カブラハバチ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
アザミウマ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ホウレンソウ

アブラムシ類	< 一部多 >	府中市の一部で発生が多かった。
アカザモグリハナバエ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ネギ

さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ネギアザミウマ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ネギハモグリバエ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ネギアブラムシ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

ジャガイモ

疫病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
----	-------	---------------

ニジュウヤホシテントウ

< 一部やや多 > 一部地域で発生がやや多かった。

野菜共通の病害虫

マメハモグリバエ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
----------	-------	-----------------

ナモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
タネバエ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ネキリムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

(5) 花きの病害虫

キ ク

アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
キクスイカミキリ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
アザミウマ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

花き共通

ナモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

(6) 植木の病害虫

ツバキ・サザンカ

チャドクガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
-------	---------	----------------

ツツジ

ツツジグンバイムシ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ツチイロヒゲボソゾウムシ	< 一部多 >	青梅市の一部で発生が多かった。

ケヤキ

ケヤキヒゲマダラアブラムシ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
---------------	-------	--------------

街路樹（サクラ・ケヤキ等）

アブラムシ類	< 多 >	各地とも発生は多かった。
--------	-------	--------------

(7) 島しょの病害虫

八丈島

トビモンオオエダシャク	< 少 >	発生は少なかった。
-------------	-------	-----------

その他

ネコブセンチュウ	< やや多 >	各島において、フリージア跡地・展示園予定地等で発生はやや多かった。
----------	---------	-----------------------------------

病害虫の発生予報、発生状況などをお知らせしています。

テレホンサービス

042 (525) 8236

インターネットホームページ

<http://www.taes.metro.tokyo.jp/boujo>

