

# 病害虫発生予察情報

## 8 月月報

平成 12 年 9 月 14 日  
東京都病害虫防除所

### 1 気象概況

| 8 月 | 気    |     | 温    |     | 降 水 量 |     | 日照時間 |        |
|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|--------|
|     | 最 高  | 最 低 | 平 均  |     | (mm)  |     | (h)  |        |
|     | 本年   | 平年差 | 本年   | 平年差 | 本年    | 平年差 | 本年   | 平年比(%) |
| 上旬  | 32.7 | 2.4 | 23.3 | 0.8 | 27.6  | 1.6 | 18   | 22     |
| 中旬  | 30.3 | 0.3 | 23.2 | 0.3 | 26.4  | 0.1 | 39   | 70     |
| 下旬  | 32.6 | 2.8 | 24.6 | 2.2 | 27.9  | 2.2 | 2    | 4      |
| 平均  | 31.9 | 1.7 | 23.7 | 1.1 | 27.3  | 1.3 |      |        |
| 合計  |      |     |      |     |       |     | 59   | 32     |

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差 (比)：平年値 (1979-1990 年の平均値) からの差 (比)

- ◎ 気 温：上・下旬は平年よりかなり高かったが、中旬は平年並であった。
- ◎ 降 水 量：上・下旬は平年よりかなり少なかったが、中旬は平年並であった。
- ◎ 日照時間：上旬は平年よりかなり多く、中・下旬はやや少なかった。

#### <天候概況>

上旬：太平洋高気圧に覆われ、晴れて暑い日が多かった。

中旬：台風 9 号と上空に寒気が入った影響等で、曇りや雨のひが多かった。

下旬：太平洋高気圧に覆われ、晴れて暑い日と、南からの暖かく湿った風や気圧の谷の影響で曇りの日があった。

### 2 作物生育概況

#### (1) イ ネ

出穂期は平年より 7 日程遅く、やや徒長気味であった。

#### (2) サツマイモ

塊茎の肥大は順調であった。

#### (3) 果 樹

ナ シ：早生品種の収穫始期は平年並か 1 2 日遅かった。 中生品種の収穫時期は平年であった。果実肥大は、平年並からやや良であった。

ク リ：早生品種の収穫期は平年並であった。果実肥大は平年並かやや不良であった。

カ キ：特記事項なし

ブドウ：収穫期は平年並であった。地域により高尾の着色が平年より極端に不良となった。果実肥大は、平年並かやや不良であった。

(4) 茶 樹

高温乾燥条件であったが、夏芽の生育不良・枯死は特にみられず、生育は概ね順調であった。

(5) 野菜類

果菜類：全体として高温、乾燥で経過したため、ナス等の生育は劣る傾向にあった。

葉菜類・根菜類：施設のコマツナは高温の影響により葉色が薄く、軟弱ぎみの生育であった。キャベツ、ブロッコリー等では、乾燥の影響により定植後の生育が遅れる傾向にあった。

### 3 病害虫の発生概況

(1) イネの病害虫

|           |         |                                                      |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| いもち病      | <やや少 並> | 発生は山間部で局所的にやや多い水田も認められたが、全般的にはやや少 平年並であった。           |
| 紋枯病       | <やや少 並> | 各地とも発生はやや少 平年並であった。                                  |
| 内穎褐変病     | < 多 >   | 各地で多発した。特に台風 9 号による降雨の影響を受けた 13 日前後に出穂した水田で被害が激しかった。 |
| ニカメイガ     | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。                                      |
| ヒメトビウンカ   | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。                                      |
| ツマグロヨコバイ  | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。                                        |
| セジロウンカ    | < 多 >   | 各地とも発生は多かった。                                         |
| トビイロウンカ   | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。                                        |
| イネツトムシ    | <やや少>   | 各地とも発生はやや少なかった。                                      |
| シンガレセンチュウ | <やや多>   | 各地とも発生はやや多かった。                                       |
| 斑点米カメムシ類  | < 多 >   | 山間部で特にクモヘリカメムシの発生が多かった。                              |

(2) 果樹の病害虫

|               |       |                    |
|---------------|-------|--------------------|
| ナ シ           |       |                    |
| アブラムシ類        | <やや少> | 各地とも発生はやや少なかった。    |
| ニセナシサビダニ      | < 並 > | 各地とも発生は平年並であった。    |
| ハダニ類          | <やや多> | 各地とも発生はやや多かった。     |
| カ キ           |       |                    |
| 円星落葉病         | <局所多> | 国立市で局所的に激しい発病を認めた。 |
| ヒメクロイラガおよびイラガ | < 並 > | 各地とも発生は平年並であった。    |
| 果樹共通          |       |                    |
| カメムシ類         | <やや少> | 各地とも発生はやや少なかった。    |

(3) 茶樹の病害虫

|             |       |                 |
|-------------|-------|-----------------|
| チャハマキ       | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。   |
| チャノコカクモンハマキ | < 並 > | 各地とも発生は平年並であった。 |

|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| チャノホソガ  | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。 |
| カンザワハダニ | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。  |

## (4) 野菜の病害虫

## トマト

|          |         |                 |
|----------|---------|-----------------|
| マメハモグリバエ | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| オオタバコガ   | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |

## ナス

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| うどんこ病       | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。 |
| ハダニ類        | < 多 >   | 各地とも発生は多かった。    |
| チャノホコリダニ    | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。  |
| ワタアブラムシ     | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。 |
| ミナミキイロアザミウマ | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。   |

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| ミカンキイロアザミウマ | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。 |
| ナスノミハムシ     | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| フキノメイガ      | < 並 >   | 各地とも発生は平年並であった。 |
| ニジュウヤホシテントウ | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |

## ピーマン

|       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| タバコガ類 | < 多 > | 各地とも発生は多かった。 |
|-------|-------|--------------|

## キュウリ

|             |       |               |
|-------------|-------|---------------|
| ミカンキイロアザミウマ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
|-------------|-------|---------------|

## キャベツ

|           |         |                |
|-----------|---------|----------------|
| コナガ       | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。  |
| ネキリムシ類    | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |
| ハイマダラノメイガ | < 多 >   | 各地とも発生は多かった。   |

## コマツナ

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| 炭疽病        | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。   |
| 萎黄病        | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| コナガ        | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| ヒラズハナアザミウマ | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| ハイマダラノメイガ  | < 多 >   | 各地とも発生は多かった。    |
| カブラハバチ     | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| キスジノミハムシ   | < 多 >   | 各地とも発生は多かった。    |

## ダイコン

|           |       |              |
|-----------|-------|--------------|
| ハイマダラノメイガ | < 多 > | 各地とも発生は多かった。 |
|-----------|-------|--------------|

## ネギ

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| さび病      | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。  |
| 黒斑病      | < 少 >   | 各地とも発生は少なかった。  |
| ネギアザミウマ  | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |
| ネギハモグリバエ | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |

スイートコーン

アワノメイガ <やや多> 各地とも発生はやや多かった。

サトイモ

ハスモンヨトウ <一部多> 青梅市の一部で発生が多かった。

野菜共通の病害虫

マメハモグリバエ <やや少> 各地とも発生はやや少なかった。

ワタアブラムシ <やや少> 各地とも発生はやや少なかった。

ハスモンヨトウ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

オオタバコガ <やや少> 各地とも発生はやや少なかった。

フキノメイガ <やや少> 各地とも発生はやや少なかった。

カブラヤガ <やや多> 各地の各種作物で発生はやや多かった。

カメムシ類 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

(5) 花きの病害虫

キ ク

ミカンキイロアザミウマ  
<やや少> 各地とも発生はやや少なかった。

シクラメン

チャノホコリダニ <やや多> 各地とも発生はやや多かった。

ミカンキイロアザミウマ  
< 並 > 各地とも発生は平年並であった。

(6) 植木の病害虫

チャドクガ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

(7) 島しょの病害虫

<大島>

ミカンキイロアザミウマ：ガーベラでの発生がやや多かった。

病害虫の発生予報、発生状況などをお知らせしています。

テレホンサービス

042 (525) 8236

インターネットホームページ

<http://www.taes.metro.tokyo.jp/boujo>

