

病虫害発生予察情報

3 月月報

平成 11 年 4 月 30 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

3 月	気 高		温 低		平 均		降 水 量		日照時間	
	最	高	最	低	平	均	(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	年比
上旬	12.8	2.3	3.4	2.0	8.3	2.3	14	77	55.4	116
中旬	14.9	2.7	6.3	3.5	10.4	3.0	63	167	34.6	65
下旬	12.5	0.6	4.4	0.3	8.3	0.3	53	92	45.4	94
平均	13.4	1.4	4.7	1.9	9.0	1.6				
合計							130	114	135.4	91

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979～1990 年の平均値)からの差(比)

気 温：上・中旬は平年よりかなり高かった。

降 水 量：中旬は平年よりかなり多かった。

日照時間：中旬は平年より少なかった。

<天候概況>

上旬の前半は移動性高気圧に覆われおおむね晴れたが、後半は低気圧等の影響でぐずついた。

中旬は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は周期的に変化した。特に 15 日は大雨となり、14～19 日は気温が高かった。

下旬は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は周期的に変化した。

2 作物生育概況

(1) ム ギ

生育は順調であった。

(2) 果 樹

ウ メ：開花時期は、平年並みかやや早かった。

ナ シ：萌芽(発芽)期は平年よりやや早かった。

(3) 茶 樹

特記事項なし

(4) 野 菜 類

果菜類：施設トマトの生育は順調であった。また、育苗初期のトマト・ナスの生育は順調であった。

葉菜類：ハウレンソウ、コマツナの生育は順調であった。キャベツの生育は概ね順調であった。

根菜類：ダイコンの生育は順調であった。

3 病害虫の発生概況

(1) イネ・ムギの病害虫

特記する事なし

(2) 果樹の病害虫

特記する事なし

(3) 茶樹の病害虫

カンザワハダニ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

(4) 野菜の病害虫

キュウリ（施設）

ワタアブラムシ < 少 > 各地とも発生は少なかった

トマト（施設）

灰色かび病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

葉かび病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

オンシツコナジラミ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

マメハモグリバエ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

トマトサビダニ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

トマト・ナス・キュウリ（育苗）

ケナガコナダニ < 少 > 各地の育苗床で発生は少なかった。

ミカンキイロアザミウマ < 少 > 各地の育苗床で発生は少なかった。

コカブ・コマツナ（施設）

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ナモグリバエ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ハウレンソウ（施設およびトンネル）

べと病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

アブラムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

ケナガコナダニ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

レタス

ナモグリバエ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

野菜類共通の害虫

ヤサイゾウムシ < やや多 > 各地のハクサイ、コマツナなどで発生がやや多かった。

(5) 花き類の病害虫

ガーベラ（施設）

オンシツコナジラミ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

ナモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
マメハモグリバエ	< 少 >	一部地域で少発生であった。
ナミハダニ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
花き類共通の病害虫		
灰色かび病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ナモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

(6) 島しょの病害虫

トビモンオオエダシャク(成虫) 八丈島における成虫の発生は、昨年の同時期に比べきわめて少なかった。

テレフォンサービス

042(525)8407

病害虫の発生予報、発生状況、
防除方法をお知らせしています。