

病虫害発生予察情報

5月月報

平成 11 年 6 月 30 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

5 月	気		温		降 水 量		日照時間			
	最 高	最 低	平 均		(mm)		(h)			
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	年比
上旬	23.0	1.1	12.6	0.5	18.1	1.2	64	201	57.3	121
中旬	22.5	0.6	14.5	1.7	18.2	0.9	19	36	39.4	89
下旬	25.5	2.3	15.9	2.1	20.5	2.0	18	59	42.4	83
平均	23.8	1.4	14.4	1.5	19.0	1.4				
合計							101	88	139.1	97

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979～1990年の平均値)からの差(比)

- ◎ 気 温：平均気温は月を通して平年よりやや高かった。
- ◎ 降 水 量：上旬は平年よりやや多かったが、中・下旬はやや少なかった。
- ◎ 日照時間：月を通して平年並であった。

<天候概況>

上旬は平均気温がかなり高く、4日は大雨となった

中旬は降水量は平年よりかなり少なかった。

下旬は平均気温がかなり高かった。

2 作物生育概況

(1) ム ギ (コムギ)

生育は順調で、黄熟期は平年より7日ほど早かった。

(2) イ ネ

育苗箱、苗代ともに生育は平年よりやや早かった。

(3) サツマイモ

苗の活着は良好であった。

(4) 果 樹

ウ メ：小梅の収穫は5月下旬で、平年並みであった。

ナ シ：着果の程度はおおむね平年並みであったが、開花の早い品種は地域によって平年よりやや少なかった。

カ キ：開花期は平年より5 7日早かった。

ク リ：開花期は平年より2 3日早かった。

ブドウ：開花期は平年より5 7日早かった。

(5) 茶 樹

摘採時期は平年並であった。

(6) 野菜類

果 菜 類：生育はほぼ順調であった。

葉 菜 類：キャベツ他、生育は順調であった。

根 菜 類：ダイコンの生育は順調であった。

ジャガイモ：塊茎の肥大は順調であった。

3 病害虫の発生概況

(1) イネの病害虫

ばか苗病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
イネミズゾウムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ツマグロヨコバイ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ヒメトビウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

(2) ムギの病害虫

うどんこ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
-------	-------	---------------

(3) 果樹の病害虫

ナ シ		
赤星病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
黒星病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
カメムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ハマキムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ブドウ		
毛せん病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
カ キ		
カキクダアザミウマ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ウ メ		
タマカタカイガラムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
キウイ		
キウイヒメヨコバイ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

(4) 茶樹の病害虫

ハマキムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
カンザワハダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(5) 野菜の病害虫

キュウリ

うどんこ病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
べと病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
菌核病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
斑点細菌病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
スリップス類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

トマト（施設）

灰色かび病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
葉かび病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
白ぶくれ症状	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
タバココナジラミ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
オンシツコナジラミ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
オオタバコガ	< 少 >	各地とも発生は確認されなかった。
ワタアブラムシ	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。

ナス

ハダニ類	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

ネギ

さび病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ネギアザミウマ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ネギハモグリバエ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ネギアブラムシ	< 多 >	各地とも発生は多かった。

キャベツ

菌核病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
コナガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ヨトウガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。

コマツナ

白さび病	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
コナガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ナモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
カブラハバチ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ヒラズハナアザミウマ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

イチゴ

灰色かび病	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
-------	---------	---------------

サトイモ

ワタアブラムシ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
---------	---------	----------------

スイートコーン

ネダニ類・ハリガネムシ・ネキリムシ・コガネムシ

＜やや少＞ 各地とも発生は少なかった。

ハウレンソウ

アカザモグリハナバエ＜ 少 ＞ 各地とも発生は少なかった。

カブ・ダイコン

コナガ ＜やや多＞ 各地とも発生はやや多かった。

レタス

菌核病 ＜やや少＞ 各地とも発生は少なかった。

野菜共通

マメハモグリバエ ＜やや少＞ 各地とも発生は少なかった。

ナモグリバエ ＜ 多 ＞ 各地とも発生は多かった。

タネバエ ＜やや少＞ 各地とも発生は少なかった。

ネキリムシ類 ＜ 並 ＞ 各地とも発生は平年並であった。

(6) 花き・植木の病害虫

キ ク

キクスイカミキリ ＜ 多 ＞ 各地とも発生は多かった。

ツバキ・サザンカ

チャドクガ ＜やや多＞ 各地とも発生はやや多かった。

マツ・ゴヨウマツ

カイガラムシ類 ＜やや多＞ 各地とも発生はやや多かった。

アブラムシ類 ＜ 多 ＞ 各地とも発生は多かった。

ハダニ類 ＜やや少＞ 各地とも発生は少なかった。

その他

ツツジグンバイムシ ＜やや多＞ 各地とも発生はやや多かった。

ナモグリバエ ＜やや多＞ 各地とも発生はやや多かった。

ミカンキイロアザミウマ

＜ 並 ＞ 各地とも発生は平年並であった。

ケヤキヒゲマダラアブラムシ

＜ 並 ＞ 各地とも発生は平年並であった。

ケヤキのハモグリバエの一種

＜ 並 ＞ 各地とも発生は平年並であった。

(7) 島しょの病害虫

アシタバ

ヨトウガ ＜ 多 ＞ 八丈島で発生が多かった。

フキバッタの一種 ＜ 並 ＞ 発生は平年並であった。

レザーファン

アオドウガネ ＜ 並 ＞ 発生は平年並であった。

その他

トビモンオオエダシャク

＜ 少 ＞ 八丈島での発生は少なかった。

シキミグンバイ

＜局所多＞ 新島で発生が多かった。

テレフォンサービス
042(525)8407

病害虫の発生予報、発生状況、
防除方法をお知らせしています。