

病害虫発生予察情報

6月月報

平成 11 年 7 月 30 日
東京都病害虫防除所

1 気象概況

6月	気		温		降 水 量		日照時間			
	最 高	最 低	平 均		(mm)		(h)			
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	年比
上旬	27.6	2.3	18.1	1.5	22.5	1.8	11	38	44.1	116
中旬	26.6	1.8	18.2	0.9	22.2	1.4	35	69	44.3	167
下旬	25.4	0.9	18.9	0.8	21.9	0.8	93	117	5.7	37
平均	26.5	1.6	18.4	1.1	22.2	1.3				
合計							139	87	94.1	117

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979～1990年の平均値)からの差(比)

- ◎ 気 温：上旬は平年に比べて高く、中・下旬はやや高めに推移した。
- ◎ 降 水 量：上旬は平年より少なかったが、中・下旬は平年並であった。
- ◎ 日照時間：上旬は平年並、中旬は多く、下旬は少なかった。

<天候概況>

6月3日頃に梅雨入り(平年は6月9日頃)したが、上旬は晴れが多かった。
中・下旬は梅雨前線の影響で雨の日が多く、特に30日は大雨となった。

2 作物生育概況

(1) ム ギ (コムギ)

成熟期は平年より5日ほど早かった。

(2) イ ネ

平年と比べ葉色がやや淡かった。

(3) サツマイモ

生育は順調であった。

(4) ダイズ・ラッカセイ

生育は順調であった。

(5) 果 樹

- ナ シ：果実生育は、平年並みであった。
 ウ メ：大梅の収穫期、果実肥大、揃いの程度は、いずれも平年並みであった。
 ク リ：雄花、雌花とも開花期は平年並みであった。
 カ キ：生育は、平年並みかやや早かった。
 ブドウ：果実生育は平年並みであった。

(6) 茶 樹

- 二番茶芽の生育は平年並であった。

(7) 野菜類

- 果 菜 類：トマト、キュウリの生育は概ね順調であった。ナスは中旬までの小雨により、生育がやや緩慢であった。
 葉 菜 類：キャベツの収穫は順調であった。
 根 菜 類：ダイコンの生育は順調であった。
 ジャガイモ：収穫期をむかえ、作柄は平年並 やや良であった。

3 病虫害の発生概況

(1) イネの病虫害

- | | | |
|----------|---------|-----------------|
| いもち病 | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
| ばか苗病 | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |
| イネミズゾウムシ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
| ツマグロヨコバイ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
| ヒメトビウンカ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |

(2) 果樹の病虫害

- ナ シ
- | | | |
|----------|---------|----------------|
| 黒星病 | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |
| 黒斑病 | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
| アブラムシ類 | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |
| ニセナシサビダニ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
- リンゴ
- | | | |
|----------|-------|--------------------------------|
| チョッキリゾウ類 | < 少 > | モモチョッキリおよびカシルキチョッキリとも発生は少なかった。 |
|----------|-------|--------------------------------|
- カ キ
- | | | |
|------------|-------|---------------|
| カキクダアザミウマ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
| オオワタカイガラムシ | < 少 > | 各地とも発生は少なかった。 |
- 果樹共通
- | | | |
|------------|---------|-----------------|
| チャバネアオカメムシ | < やや多 > | 各地とも発生はやや多かった。 |
| クサギカメムシ | < やや少 > | 各地とも発生はやや少なかった。 |

(3) 茶樹の病害虫

チャハマキ	< 少 並 >	各地ともチャノコカクモンハマキが平年並のほか チャハマキ、チャノホソガの発生は少なかった。
カンザワハダニ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
ナガチャコガネ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(4) 野菜の病害虫

トマト

モザイク病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
青枯病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
葉かび病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
白ぶくれ症状	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
オンシツコナジラミ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ナス

半身萎凋病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ハダニ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ミナミキイロアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

チャノホコリダニ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
----------	---------	-----------------

キュウリ

うどんこ病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
べと病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
斑点細菌病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ミナミキイロアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ネギ

さび病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ネギハモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ネギアザミウマ	< 多 >	各地とも発生は多かった。

キャベツ

黒腐病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
コナガ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
ネギアザミウマ	< 局所多 >	各地で局所的に多発し、被害部は黒色のアザ状を呈した。

ヨトウガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
------	-------	-----------------

コマツナ

白さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
炭そ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
萎黄病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
コナガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。


カブラハバチ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
サトイモ		
ワタアブラムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
スイートコーン		
アワヨトウ・アワノメイガ・ヨトウガ	< 並 やや多 >	各地とも発生は平年並 や や多であった。
サツマイモ		
イモキバガ	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
インゲン		
カメムシ類	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
野菜共通		
マメハモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生は少なかった。
ナモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
タバコガ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

(5) 花き・植木の病虫害

キ ク		
キクスイカミキリ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
キクモンサビダニ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
キクヒメヒゲナガアブラムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
花き共通		
灰色かび病（施設）	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ナモグリバエ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
マメハモグリバエ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ツバキ		
チャドクガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
植木類		
うどんこ病	< 多 >	各地のトウカエデ、ハナミスキ、サルスベリなどで発生が多かった。
アメリカシロヒトリ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
マツカサアブラムシ	< やや多 >	各地のマツ類（庭木）で発生がやや多かった。

(6) 島しょの病虫害

サンキライ		
スガ科の一種	< やや多 >	大島で発生がやや多かった。



東京都病害虫防除所

テレフォンサービス

042-525-8407