

# 家保通信

Vol. 32 No. 8 11月号  
東京都家畜保健衛生所



平成30年10月29日

かほクイズ

HPAIの「特定症状」は？

「1日の家きんの死亡率が平均の

①2倍 ②5倍 ③10倍

以上となること」

答えは裏面



## 渡り鳥の飛来シーズンに向けて早めの対策を！

今年1月に香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ(以下、HPAI)の発生がありました。また、10月22日に、千葉県で採取された野鳥の糞便から、今シーズン初めて低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。今後、本格的な渡り鳥の飛来シーズンをむかえるにあたり、国内へのHPAIウイルス侵入リスクが非常に高まります。

早めの防疫対策と飼養衛生管理の自己点検の実施をお願いします！



### 飼養衛生管理の確認ポイント

- ✓ 部外者の立入禁止、不要な物の持ち込み禁止
- ✓ 衛生管理区域、鶏舎への出入りの際の消毒の徹底
- ✓ 家きん舎出入口への踏み込み消毒槽の設置と定期的な消毒薬の交換
- ✓ 家きん舎への防鳥ネットの設置、修繕
- ✓ 家きん舎の壁の破損や隙間の修繕
- ✓ 家きん舎周囲の清掃、整理整頓

周囲に水辺がある場合は

- ✓ 忌避テープ等による野鳥飛来防止対策

#### 防疫対策例



車両消毒



破損箇所の修繕



消毒液の定期的交換



周囲の整理整頓

- ・ 死亡羽数が通常の2倍以上に増加した
  - ・ 5羽以上がまとまって死亡している など、
- 家きんに異状がみられた場合は直ちに当所までご連絡ください！



## 牛の精液・受精卵は動物検疫の対象物品です

先日、動物検疫所の輸出検査を受けずに、海外へ和牛の凍結精液・受精卵が持ち出された事例がありました。これらは不正に持ち出されたものであるため、全量廃棄となりました。**和牛の精液や受精卵**に関しては、現在、家畜衛生条件が締結されている国がないことから、**どの国にも輸出することはできません**。詳しくは同封の資料をご覧ください。



## 豚コレラ・アフリカ豚コレラについての続報

岐阜県での豚コレラ発生後、野生いのししの調査が実施され、死亡または捕獲されたいのししで**35頭の陽性**(10月21日現在)が確認されました。

また、中国ではアフリカ豚コレラの発生が拡大し、10月1日には**新千歳空港で、北京からの旅客が持ち込んだ豚肉ソーセージからアフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が検出**されました。現在、国内への疾病侵入リスクが非常に高まっている状況です！

同封のリーフレットや、下記の野生いのしし対策のポイントを参考に、引き続きウイルス侵入防止対策の強化をお願いします！

### 野生いのしし対策のポイント



#### ① 隠れ場所の除去

- ▶ 農場内、農場周辺の草刈り等

#### ② いのししから畜舎内（豚やエサ等）の目隠し

- ▶ 豚舎の扉を確実に閉める
- ▶ 排泄物・エサ・死体保管場所等の周囲にトタンの柵を張る、ブルーシートで覆う
- ▶ 給餌エサの放置せず、こまめに掃除する

#### ③ 侵入防止対策の継続

- ▶ 畜舎やエサ等の保管場所に柵の設置・修繕
- ▶ 消石灰の散布等による消毒

### いのししの特徴

#### 警戒心が強い

草の伸びた場所など隠れ場所があると、いのししは安心して寄ってきます

#### 雑食性

#### 環境把握能力が抜群

多少の柵があっても餌があることがわかると突破する努力をします

クイズの答え ① HPAIの特定症状は「一日の家きんの死亡率が過去21日間の平均死亡率の2倍以上となること」。この他にも5羽以上がまとまって死亡しているなど、家きんに異状がみられた場合はただちに当所までご連絡ください。

発行日 平成30年10月29日

編集発行 東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4

TEL : 042-524-8001 FAX : 042-523-4286

携帯 : 090-6941-4315